

INNO EXPERT METHOD

Técnicas exclusivas
de aplicación



by Victor García



by Rafrel Zambrano



by Uriel Hedding



by Gladys Velazco



by Anastasiia Lapshyna



by Anna Tsebrovska

DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	PRODUCTOS	MATERIAL	TÉCNICA	PROTOCOLO	BENEFICIOS
Biorevitalización y efecto tensor.	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida global de estructura facial. • Flacidez y desorganización tisular. • Pacientes a partir de los 45 años. 	<p>INNO-CE® BI-DENS 2.5, INNO-CE® MOIST 1.5, INNO-CE® MESH ESSENCE, INNO-TDS® MATRIX, INNO-TDS® FILL UP</p>	<p>Cánula de 25G Aguja 27 G x 1/2 Aguja 30 G x 1/2 Aguja 30 G x 4mm Jeringa 3 ml Marcador dérmico</p>	<p>Combinación vectorial, de pilares y anclajes estructurales con cánula y aguja.</p>	<p>1ª SESIÓN → 21 DIAS → 2ª SESIÓN → 21 DIAS → 3ª SESIÓN Repetir cada 4 meses</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora del soporte global del rostro. • Organización estructural de los tejidos faciales. • Resultado natural y armónico.
Redensificación dérmica y reposicionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de densidad dérmica y piel apagada. • Flacidez cutánea moderada. • Pacientes a partir de los 40 años. 	<p>INNO-CE® BI-DENS 2.5, INNO-CE® MOIST 1.5</p>	<p>Cánulas 22G x 50mm Cánulas 25G x 50mm Marcador dérmico</p>	<p>Aplicación vectorial en planos cartesianos con cánula mediante retroinyección.</p>	<p>1ª SESIÓN → 21 o 30 DIAS → 2ª SESIÓN → 21 o 30 DIAS → 3ª SESIÓN Repetir una vez al año</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora visible de la calidad, textura y luminosidad de la piel. • Incremento de la densidad dérmica. • Piel más homogénea y revitalizada.
Regeneración tisular multicapa.	<ul style="list-style-type: none"> • Flacidez facial leve a moderada. • Signos de envejecimiento progresivo. • Pacientes a partir de los 35 años. 	<p>INNO-CE® BI-DENS 2.5</p>	<p>Jeringa precargada de 3 ml Marcador dérmico Regla flexible</p>	<p>Anclajes estructurales en puntos anatómicos predefinidos con aguja.</p>	<p>Escala de GLOGAU de I a III</p> <p>1ª SESIÓN → 21 o 30 DIAS → 2ª SESIÓN Reaplicación cada 6 meses</p> <p>Escala de GLOGAU de IV a VI</p> <p>1ª SESIÓN → 21 o 30 DIAS → 2ª SESIÓN → 21 o 30 DIAS → 3ª SESIÓN Reaplicación cada 6 meses</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Efecto lifting progresivo y natural. • Mejora de la firmeza y tonicidad cutánea. • Activación de los mecanismos regenerativos de la piel.
Armonización facial basada en compartimentos grasos.	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida o desplazamiento de volúmenes grasos. • Alteración del contorno facial u óvalo. • Pacientes a partir de los 45 años. 	<p>INNO-TDS® FIRMING, INNO-TDS® FACE NADE, INNO-TDS® TIGE, INNO-TDS® MATRIX, INNO-TDS® RESTRUCTURER</p>	<p>Cánulas de 25 Gx40 mm Cánulas de 27Gx50mm Agujas tuberculina Marcador dérmico Anestesia local/tópica</p>	<p>Aplicación con cánula en panículos adiposos superficiales, ligamentos e interseptos.</p>	<p>1ª SESIÓN → INTERVALO DE 21 o 30 DIAS → 2ª SESIÓN → INTERVALO DE 21 o 30 DIAS → 3ª SESIÓN Repetir una vez al año</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restauración de los volúmenes faciales. • Definición del contorno facial. • Aspecto facial más estructurado y equilibrado.
Rejuvenecimiento periocular estructural.	<ul style="list-style-type: none"> • Flacidez cutánea periocular leve a moderada. • Líneas finas y contorno ocular fatigado. • Pacientes a partir de los 40 años. 	<p>INNO-TDS® DNA PEPT-HA combinado con INNO-CE® MOIST</p>	<p>Cánula 25Gx50mm Agujas 30Gx12 Marcadores dérmicos Conector para mezclar productos Jeringas Luer Lock 2.5 ml Microneedling con aguja de 30G</p>	<p>Abordaje combinado de microneedling, aplicación e inyecciones con aguja y cánula.</p>	<p>1ª SESIÓN → 21 DIAS → 2ª SESIÓN → 30 DIAS → 3ª SESIÓN → 30 DIAS → 4ª SESIÓN → 30 DIAS → 5ª SESIÓN de 3 a 5 sesiones según necesidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contorno ocular más definido y descansado. • Mejora de la firmeza periocular. • Reducción visible de líneas finas.
Regeneración de tejido cicatricial.	<ul style="list-style-type: none"> • Cicatrices atróficas o hipertróficas. • Estrías atróficas. • Alteración de la calidad del tejido cicatricial. 	<p>INNO-CE® MESH SCARS, INNO-TDS® DNA PEPT-HA, INNO-EXO® Skin Recovery, INNO-EXO® MCA 35</p>	<p>Microneedling con aguja de 30G</p>	<p>Abordaje combinado de microneedling, aplicación inyectable y peeling.</p>	<p>1ª SESIÓN → 30 DIAS → 2ª SESIÓN → 30 DIAS → 3ª SESIÓN → 30 DIAS → 4ª SESIÓN → 30 DIAS → 5ª SESIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora de la calidad y elasticidad del tejido cicatricial. • Homogeneización de la textura cutánea. • Piel de aspecto más regular.